



Datos del corazón de 2007: Latinos e hispanoamericanos

Las enfermedades cardiovasculares todavía N° 1

Nota: "Latino" incluye la gente en los Estados Unidos de ascendencia latinoamericana. En las estadísticas del gobierno de los Estados Unidos, "hispano" incluye las personas cuyos antepasados provienen de México, Puerto Rico, Cuba, España, los países de habla española de Centro o Sud América, la República Dominicana y otras culturas hispánicas, sin distinción de raza. No incluye gente de Brasil, las Guayanas, Surinam, Trinidad, Belice y Portugal, porque el español no es la primera lengua en esos países. Muchos de nuestros datos se aplican a mexicoamericanos o mexicanos, según lo reportado por las agencias del gobierno o estudios específicos. En muchos casos, datos referentes a todos hispanos no están disponibles.

DATO: Las enfermedades del corazón y los ataques al cerebro son la causa N° 1 de muerte en los latinos e hispanos. Se llevan la vida de 28.6 por ciento de los más de 122,000 hispanos o latinos que mueren por año. El cáncer les sigue, siendo responsable por 19.7 por ciento.


DATO: Entre los adultos mexicoamericanos, un 31.6 por ciento de los hombres y un 34.4 por ciento de las mujeres tiene enfermedades cardiovasculares (CVD, siglas en inglés).

DATO: Comparados con los blancos no hispanos, los hispanos en los Estados Unidos tienen menos probabilidades, y los mexicoamericanos tienen casi la misma probabilidad, de tener la presión arterial alta (HBP, siglas en inglés).

DATO: Comparados con los blancos no hispanos y los negros no hispanos, los hombres mexicoamericanos son más propensos a tener el colesterol en sangre alto y las mujeres hispanas hacen actividad física con menos frecuencia.

DATO: Comparados con los blancos no hispanos, los mexicoamericanos son más propensos a tener sobrepeso o ser obesos, y a tener diabetes. Estos factores aumentan su riesgo de tener CVD.

DATO: En 2004, por cada 100,000 personas en los Estados Unidos, unas 150.5 murieron de enfermedad coronaria (CHD). Ésa es la tasa de muerte por CHD, ajustada por edad, de toda la población. En 2003, la tasa de muerte por CHD de los hispanos fue 130 por 100,000 habitantes.*



Causas de muerte de los hispanos o latinos en los Estados Unidos, datos finales de 2003

* Los estimados están ajustados por edad.

La Asociación Americana del Corazón invirtió unos \$544 millones durante el año fiscal 2005-06 en apoyo de investigación científica, de educación profesional y pública y de programas de servicio comunitario.

La investigación científica intenta reducir continuamente la incapacidad y la muerte debidas a los ataques al corazón, a los ataques cerebrales y a otras enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos.

Nota: Las categorías de "Enfermedades del corazón" y de "ataques al cerebro" combinadas no constituyen el "Total de enfermedades cardiovasculares". Por lo tanto algunas de las muertes en "Todas las otras causas" están relacionadas con las CVDs.

Para más información llame al 1-888-4-STROKE o visite StrokeAssociation.org

Heart Facts 2007: Latino/Hispanic Americans


Cardiovascular Diseases Still No. 1

Note: "Latino" includes people in the United States of Latin American descent. In U.S. government statistics, "Hispanic" includes persons who trace their ancestry to Mexico, Puerto Rico, Cuba, Spain, the Spanish-speaking countries of Central or South America, the Dominican Republic or other Spanish cultures, regardless of race. It doesn't include people from Brazil, Guyana, Suriname, Trinidad, Belize and Portugal, because Spanish is not the first language in those countries. Much of our data are for Mexican Americans or Mexicans, as reported by government agencies or specific studies. In many cases, data for all Hispanics are more difficult to obtain.

FACT: Diseases of the heart and stroke rank as the No. 1 killer of Latino/Hispanic Americans. They claim the lives of 28.6 percent of the more than 122,000 Hispanics or Latinos who die each year. Cancer follows, killing 19.7 percent. All other causes of death account for 51.7 percent.

FACT: Among Mexican-American adults, 31.6 percent of men and 34.4 percent of women have cardiovascular disease (CVD).

FACT: Compared with non-Hispanic whites, Hispanics in the United States are less likely and Mexican Americans are nearly as likely to have high blood pressure (HBP). Hispanics and Mexican Americans are both less likely to have HBP than non-Hispanic blacks.



[Causes of Death for Hispanics or Latinos in the United States, 2003 Final Data]

FACT: Compared with non-Hispanic white men and non-Hispanic black men, Mexican-American men are more likely to have high blood cholesterol.

FACT: Compared with non-Hispanic white and black women, Hispanic women are less likely to engage in physical activity.

FACT: Compared with non-Hispanic whites, Mexican Americans are more likely to be overweight or obese, and to have diabetes.

FACT: For every 100,000 Hispanics in the United States in 2003, 130 died from coronary heart disease (CHD), which includes heart adjusted CHD death rate.*

* Estimates are age-adjusted to remove the effect of differences in the age distribution of population groups.

The American Heart Association spent about \$544 million during FY 2005–06 on research support, professional and public education, and community service programs.

Medical research continually seeks to reduce disability and death from heart attack, stroke and other heart and blood vessel diseases.

Note: The "Diseases of the Heart" and "Stroke" categories combined do not constitute "total cardiovascular disease." Thus some of the deaths in "All Other Causes" are CVD-related.

For more information call 1-800-AHA-USA1 or visit us at americanheart.org